

# 11 rad by papuga (lub inny ptak) zaczęła jeść granulaty

Ptaki przestawiane na granulaty Harrisona powinny jeść karmę High Potency przez okres około 6-8 miesięcy.

- 1. Użyj preparatu AVIx Bird Builder jako dodatku do wody, na okres 2-3 tygodni.** Pierwiastki śladowe i jod zawarte w tym preparacie mogą zwiększyć apetyt, zatem ptak będzie chętniej próbować nowych pokarmów.
- 2. Spróbuj chlebka dla ptaków Bird Bread.** Zwykle ptaki uwielbiają te chlebki, więc można w nich przemycić małe ilości jedzenia, które do tej pory jadły. Należy stopniowo zmniejszać ilość "starego" jedzenia w chlebkach a dosypywać do niego granulaty. Na stronie [www.harrisonsbirdfoods.com/budgie.html](http://www.harrisonsbirdfoods.com/budgie.html) jest więcej rad jak nakłaniać do jedzenia granulatu małe ptaszki np. papużki faliste.
- 3. Zmień otoczenie ptaka.** Zrób ptaszce tymczasową przeprochawkę np. do pudełka kartonowego, szklanego pustego akwarium lub do nowej klatki. W nowym domku nie może być żadnych zabawek, miseczek ani żerdek. Granulaty należy wysypać na dno.
- 4. Użyj lusterka lub kartki białego papieru.** Na dnie klatki należy położyć lusterko lub gładką białą kartkę, a na to nasypać granulaty. Gładkie tło kartki może zwrócić uwagę ptaka na granulaty, natomiast "rywal" w lusterku może zachęcić ptaszka do zjedzenia granulatu zanim zrobi to "ten drugi." Obie te metody sprawdzają się szczególnie u papużek falistych.
- 5. Przesławiaj na granulaty stopniowo.** Wieczorem, nasyp do miseczki nasionka i zostaw na godzinę. Po upływie godziny wyjmij je i nasyp do pustej miseczki granulaty. Następnego dnia, zostaw miseczkę z nasionkami tylko na 30 minut rano i wieczorem. Po upływie 30 minut wyjmij nasionka i wstaw karmidełko z granulatem. Trzeciego dnia, zostaw nasionka już tylko na 15 minut rano i wieczorem, a granulaty przez resztę dnia i nocy. Czwartego dnia daj do jedzenia tylko granulaty.
- 6. Karm swojego pupila (jeśli jest oswojony) w trakcie posiłków.** Nasyp na swój talerz troszkę granulatu i udawaj, że jesz pyszne jedzenie.
- 7. Spróbuj Power Treats, Pepper Lifetime Coarse lub Adult Lifetime Mash.** Zwykle ptaki bardzo lubią smak Power Treats lub karmy Pepper Lifetime Coarse- małym ptaszkom można te duże granulki rozkruszyć. Adult Lifetime Mash też jest chętnie zjadany przez ptaki.
- 8. Posłuż się innym ptakiem jedzącym granulaty, jako modelem do naśladowania.** Można takiego ptaszka już jedzącego karmę granulowaną "wprowadzić" do klatki ptaszka niejadka lub postawić klatkę z ptaszkiem "trenerem" tuż obok klatki z naszym niejadkiem.
- 9. Podgrzej lub zwilż granulaty.** Można delikatnie podgrzać granulaty lub dodać do niego troszkę soku owocowego lub oleju z palmy czerwonej Sunshine Factor.
- 10. Zaplanuj zmianę diety pod nadzorem Twojego lekarza weterynarii.** Czasem dzieje się tak, że ptaki nie traktują granulatu jako pożywienia- wtedy dobrze jest zasięgnąć rady lekarza weterynarii i skorzystać z możliwości przestawienia ptaka na granulaty w klinice weterynaryjnej. Umożliwi to profesjonalną opiekę nad pupilem a proces przestawiania na granulaty przebiegnie sprawnie i szybko.
- 11. Jeśli wszystkie powyższe metody zawiodą,** należy wrócić do starej karmy nasionkowej, by spróbować ponownie za jakiś czas.

**Podczas przestawiania na granulaty, masa ciała ptaka (w gramach), sposób zachowania oraz odchody powinny być obserwowane u małych i średnich ptaszków codziennie, a u większych gatunków 2x w tygodniu.**

## CENA ODCHODÓW PTAKÓW

By ocenić odchody, należy dno klatki wyłożyć białym papierem. Normalny kał ptaka jedzącego nasionka jest miękki i zielony, a kał ptaków jedzących granulaty Harrisona jest koloru brązowego. Nieprawidłowy kał jest czarny lub żółty i suchy. Mocz jest bezbarwny; ilość moczu może się zwiększać gdy podajemy do jedzenia dużo owoców lub warzyw. Moczany, czyli produkt przemiany białek wydalany przez nerki, są koloru białego i o konsystencji pasty. Zwykle są zawieszane w moczu lub są na powierzchni kału. U chorych ptaków moczany zmieniają kolor z białego na np. żółty, może też ulec zmianie ilość moczu czy częstotliwość oddawania kału. Pierwsze poranne odchody oraz odchody samic składających jaja czy piskląt odkarmianych karmami do sztucznego odchowu mogą znacznie się różnić od normalnie wyglądających odchodów. Odchody ptaków chorych lub będących pod wpływem stresu mogą być większe oraz bardziej wodniste.

### Prawidłowe odchody



### Import do EU i dystrybucja w Niemczech:

AVIFOOD e.K., Hans-Cornelius-Str. 2b  
D-82166 Gräfelfing, [www.avifood.com](http://www.avifood.com)  
Phone: +49-89-854 814-60, Fax: +49-89-854 814-50  
Email: [info@avifood.com](mailto:info@avifood.com)

### Dystrybucja poza obszarem Niemiec:

AVIJAN OHG, Hans-Cornelius-Str. 2b  
D-82166 Gräfelfing, [www.avijan.com](http://www.avijan.com)  
Phone: +49-89-854-9000, Fax: +49-89-854 4600  
Email: [info@avijan.com](mailto:info@avijan.com)